

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY SE ZAVEDENÍM NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA

Vážená paní

rozhodla jste se, že si zvolíte jako formu antikoncepce zavedení nitroděložního tělíška. Rádi bychom Vám poskytli informace, díky nimž si budete moci učinit základní představu o tom, jak se tělíško do dělohy zavádí.

Vlastní výkon

Běžně se provádí ambulantně a bez podávání analgetik či anestezie. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Po zavedení gynekologických zrcadel (jako při běžném vyšetření) se provede desinfekce pochvy a děložního čípku, poté se uchopí děložní čípek do speciálních kleští (je možné pocítit lehkou bolest či štípnutí) následně se do dutiny děložní zavede jemný nástroj děložní sonda (velmi tenká tyčinka), kterou se zjistí volná průchodnost kanálu děložního hrdla a dutiny děložní. Je-li kanál volný, uloží se zavaděčem (ten je pro každé tělíško připraven přímo výrobcem a je součástí originálního balení spolu s tělíškem) nitroděložní tělíško do dutiny děložní, zavaděč se vyjme a nůžkami se zkrátí vlákna tělíška tak, aby nebyla pro pacientku obtěžující a současně umožňovala snadné vyjmutí tělíška. Tím je výkon ukončen a vyšetřovací zrcadla jsou odstraněna z pochvy.

Před vlastním výkonem a i po té Vám bude provedeno ultrazvukové vyšetření, jehož důvodem je ověřit si uložení dělohy, vyloučit aktuální stavy, které by bránily zavedení tělíška a následně správné uložení tělíška po výkonu.

Při výkonu a po něm může dojít k zvýšení intenzity krvácení.

Po výkonu je vhodné alespoň 14 dnů dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Také není bezprostředně po výkonu vhodné zavádění menstruačních tamponů, tak by mohlo dojít k event. posunu tělíška při zamotání vláken tělíška do tamponu. Krvácení ustává po výkonu do týdne.

Komplikace výkonu:

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh výkonu. I přes pečlivou přípravu a provedení vlastního výkonu může dojít k poškození a poranění dělohy, které si vyžádá provedení akutního operačního výkonu bezprostředně po komplikaci. Toto je komplikace, která může vzniknout bezprostředně při výkonu. Další komplikace mohou vzniknout v průběhu doby, kdy má žena řádně zavedené tělíško.

Jsou to následující:

- selhání antikoncepční metody – vznik těhotenství, a event. i možnost vzniku mimoděložního těhotenství
- vypuzení nitroděložního tělíška do hrdla děložního, pochvy nebo dutiny břišní
- bolesti v podbřišku a abnormální krvácení
- infekce zánětlivá pánevní nemoc
- komplikace spojené s vytažením tělíška: rozlomení tělíška zadržení části tělíška v děloze

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn princip provedení výkonu a byla jsem seznámena s možnými komplikacemi. Informacím rozumím a současně jsem měla možnost klást otázky a získat na ně přiměřenou odpověď. Souhlasím se zavedením nitroděložního tělíška.

Jméno pacientky

Rodné číslo pacientky.....

Podpis lékaře a otisk razítka.....

Ve Zlíně dne

Podpis pacientky.....